

# Ερωτήσεις-απαντήσεις



**1. Ποιο από τα παρακάτω μόρια ΔΕΝ χρησιμοποιείται για την ειδική αναγνώριση των αντιγόνων;**

- α) Κυτταροκίνες
- β) Ανοσοσφαιρίνες
- γ) Αντιγόνα Ιστούσυμβατότητας (ΜΗC)
- δ) Τ-λεμφοκυτταρικός υποδοχέας (TCR)

**2. Τι ισχύει για την ορονοσία;**

- α) Οφείλεται σε ανοσοσυμπλέγματα
- β) Χαρακτηρίζεται από πυρετό, πολυαρθρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα
- γ) Επάγεται συνήθως όταν χορηγηθούν ξένα αντιγόνα
- δ) Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας εξαρτάται από την ποσότητα του χορηγούμενου αντιγόνου
- ε) όλα τα παραπάνω

**3. Τι ΔΕΝ είναι σωστό για τον ιό Ηπατίτιδας Α (HAV);**

- α) Είναι RNA ιός
- β) Ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του ηπατοκυττάρου
- γ) Μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό
- δ) Τα αντισώματα έναντι του ιού είναι προστατευτικά δια βίου
- ε) Αναπαράγεται στο ήπαρ και αποβάλλεται στα κόπρανα

**4. Γιατί οι ασθενείς με βαριά ασκαριδίαση εμφανίζουν συχνά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα;**

- α) Λόγω της εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων στα πνευμονικά τριχοειδή
- β) Η ασκαριδίαση προδιαθέτει σε ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού
- γ) Τα ωάρια ενσφηνώνονται στα τριχοειδή με αποτέλεσμα το σχηματισμό εξιδρώματος
- δ) Οι σκώληκες διέρχονται από τους πνεύμονες

**5. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί δευτερογενές αίτιο υπερ-τριγλυκεριδαιμίας;**

- α) Υπερκατανάλωση αλκοόλ
- β) Διαβήτης τύπου 2
- γ) Παχυσαρκία
- δ) Νεφρωσικό σύνδρομο
- ε) Η θεραπευτική λήψη κορτικοστεροειδών
- στ) Η θεραπευτική λήψη θυροξίνης

**Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου τεύχους (62-3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017)**

1. δ - 2. β - 3. β - 4. ε - 5. δ

**Επιμέλεια-Αλληλογραφία**

Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,

τηλ.: 210-7462132

fax: 210-7462210

e-mail: garsenis@med.uoa.gr

